



**Sortenkatalog 2021**

**Beeren- und  
Spargelpflanzen**

**[www.hegeplanta.de](http://www.hegeplanta.de)**



## **Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beerenobst-Produzenten und Spargelanbauer,**

turbulente Ereignisse haben uns auch dieses Jahr in Atem gehalten – die Herausforderungen an unsere Betriebe in Zeiten der Pandemie ist enorm und niemand weiß wo wir in einem Jahr stehen werden.

Krise leitet sich bekanntlich vom griechischen „crisis“ ab und bedeutet vor allem „Chance“, und so sollten wir diese Zeit auch begreifen. Die Besinnung auf das ursprüngliche, regionale sollte unsere „Chance“ sein. Viele Direktvermarkter, aber auch die Mehrzahl der Produzenten durften dies in verbessertem Absatz und stabilen, höheren Preisen wahrnehmen. Wenn eine Schwalbe auch keinen Sommer macht, lassen Sie uns gemeinsam die Möglichkeiten nutzen, besser, effizienter zu werden und daran arbeiten unsere Betriebe zukunftsfähig zu machen.

Als Ihr zuverlässiger Pflanzenlieferant für Spargel-, Erdbeer- und Strauchbeerenpflanzen beraten wir Sie gerne bei allen Fragen zur Sortenwahl oder Anbaumethode.

Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in unserem eigenen Produktionsbetrieb, der einerseits stark auf Direktvermarktung ausgerichtet ist und daher auf geschmacksstarke Sorten Wert legt. Die Bedürfnisse des LEH's sind uns ebenso vertraut. Dies und unsere engmaschige Vernetzung mit Züchtern und Vermehrern versetzt uns in die Lage, Sie bei der für Sie erfolgsversprechenden Sortenwahl optimal zu unterstützen.

### **Wenden Sie sich an unser Hegeplanta-Team:**

Dieter Hege und Michael Weidenauer freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Spargel- und Beerenobstjahr 2021 !

Nutzen Sie unser Angebot.

**Für Ihren Erfolg. Von Anfang an.**

Ihr Dieter Hege mit dem gesamten Team



# Inhalt

## Ihre Ansprechpartner



### Dieter Hege

Telefon +49 (0) 6203 / 93080-10  
Mobil +49 (0) 163 / 3559-000

*Firmeninhaber Dieter Hege ist Betriebsleiter für Anbau und Vermarktung und hilft bei anstehenden Fragen gerne weiter.*



### Michael Weidenauer

Telefon +49 (0) 6203 / 93080-70  
info@hegeplanta.de

*Herr Weidenauer ist seit mehreren Jahren bei uns im Unternehmen tätig und ist für den Verkauf und die Logistik von HegePlanta verantwortlich. Er steht Ihnen gerne beratend zur Seite.*

## Spargel

Weißer Spargel .....	4
Grünspargel .....	5

## Erdbeeren

Einleitung .....	6
Neuheiten .....	7
Sehr frühe Sorten .....	8
Frühe Sorten .....	9
Mittelfrühe Sorten .....	11
Mittelspäte Sorten .....	12
Späte Sorten .....	14
Sehr späte Sorten .....	16
Immertragende Sorten, Übersicht .....	17
Sommererdbeeren Übersicht .....	20
Immertragende Sorten .....	22
Pflanzentypen .....	23

## Himbeeren

Einleitung .....	24
Sommerhimbeeren .....	26
Herbsthimbeeren .....	27
Reifezeiten .....	30
Long Canes .....	31

## Brombeeren

Sorten, Long Canes .....	32
--------------------------	----

## Johannisbeeren

Sorten .....	34
--------------	----

## Stachelbeeren

Sorten, Reifezeiten .....	38
---------------------------	----

## Heidelbeeren

Sorten, Reifezeiten .....	39
---------------------------	----

Wegeskizze, Versand, Abholung .....	40
-------------------------------------	----

# Spargelpflanzen

## Bleichspargel

Sorte	Ertrag	Qual./Dicke	Gesundheit	Erntezeit
<b>Prius</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Sehr früher Erntebeginn, empfohlener Pflanzabstand 4 Pfl/lfm. Ideal für alle Verfrühungsarten, robust im Wuchs, standfest, hohe Produktivität.				
<b>Frühlim</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Sehr früher Erntebeginn, 100 % männliche Hybride, ausgezeichnete Eignung für Minitunnel, hohes Stangengewicht und einheitliche Sortierung, robuste Pflanze.				
<b>Vitalim</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Für Regionen mit warmem Klima, sehr frühe Sorte mit sehr hohem Ertragspotential, langer Lebensdauer und äußerst starkem Laub.				
<b>Gijnlim</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Hauptsorte aufgrund der Frühzeitigkeit und des Ertrages. Anhaltend ausreichende Stangendicken schwierig, daher kürzere Stechjahre empfehlenswert. Für alle Anbauformen gut geeignet. Standard 3 Pfl/lfm.				
<b>Avalim</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Früh wie Gijnlim und Cumulus, jedoch mit ca 20% weniger Ertrag, aber deutlich dickere und gleichmäßigere Stangen. Keine echte Alternative zu Gijnlim. Teure Jungpflanzen. 3 bis 4 Pfl/lfm.				
<b>Ravel</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Gute Alternative zu Gijnlim, geringfügig mehr Aufblüher, hoher Ertrag wie Gijnlim. Auf lockeren Dammaufbau achten, Stangendicke wie Gijnlim. Standard 3 Pfl/lfm.				
<b>Ramires</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Reift kurz nach Gijnlim. Deutlich besseres Stangengewicht im Vergleich zur Hauptsorte. Mindestens 4 Pfl/lfm.				
<b>Herkolim</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Sehr dicke Stangen, anfällig für offene Köpfe, daher unbedingt auf Weiß kultivieren. Enger Pflanzabstand, mindestens 5 Pfl/lfm, besser sogar noch 7 Pfl/lfm. 15% weniger Ertrag als Gijnlim.				
<b>Grolim</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Hoher Ertrag, Dichtpflanzung 5 Pfl/lfm, hohe Stangendicke, dadurch hohe Stechleistung, schlechterer Geschmack, empfindlich gegen hohe Temperaturen.				
<b>Cynus</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Mittelfrüher Erntebeginn, 5-6 Pfl/lfm, potenziell dicke Stangen mit glattem Kopf, sehr leistungsfähig, robust im Wuchs, stark gegen Blattkrankheiten.				
<b>Ramada</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Zum Testanbau empfohlen, Reifezeitpunkt wie Ramires und Grolim. Gleichmäßig dicke Stangen, feste und geschlossene Köpfe, besonders gute Geschmacksbeurteilungen, 3 Pfl/lfm.				
<b>Rhapsody</b>	■■■■■	■■■■■	■■■■■	März: ■■■■ April: ■■■■ Mai: ■■■■ Juni: ■■■■
Erntefenster wie Backlim, jedoch höherer Ertrag. Gleichmäßig dicke Stangen. Nur für Lößlehm Böden ohne nahes Grundwasser geeignet. Empfindlich bei übermäßigen Wachstumsbedingungen, deshalb auf N-Angebot und Wasserhaushalt achten. Auf Weiß während der Haupternte kultivieren. 4 bis 5 Pfl/lfm.				

Spargelpflanzen von niederländischen und deutschen Vermehrern in hervorragender Qualität mit Zertifikat und EU Pflanzenpass.



## Raffaello



Eine späte rein männliche Spargelhybride mit hervorragenden Qualitätseigenschaften und trotz des späten Erntebeginns hohem Ertragspotential. Raffaello besitzt im Vergleich mit anderen späten Spargelsorten eine herausragende Kopffestigkeit.

## Backlim



Standardsorte im späten Erntebereich. Dicke und gleichmäßige Stangen mit gutem Geschmack. Ebenfalls in der Haupternte auf weiß kultivieren. 4 bis 5 Pfl./lfm.



Grünpargel stellt eine echte Bereicherung des Sortiments dar. Für Direktvermarkter kommen auch violettfarbene Grünpargelsorten in Frage, die zum Teil süßer schmecken. Weltweit ist anthozyanhaltiger Grünpargel Standard. In Deutschland bevorzugt man wegen der Optik und geringeren Schalendicke anthozyanfreie Sorten.

## Grünpargel

Sorte Ertrag Qual./Dicke Gesundheit Erntezeit

### Gijnlim



Vom Ertrag her eine Spitzensorte für den Grünpargelanbau. Ältere Bleichspargelanlagen sind für eine Nutzung als Grünpargel interessant. Anthozyanhaltig.

### Bacchus



Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Versuchspflanzungen empfohlen. Wenig verfügbares Pflanzgut. Ertrag ähnlich wie Primaverde. 80% Ertrag von Gijnlim.

### Xenolim



Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Versuchspflanzungen empfohlen. Wenig verfügbares Pflanzgut. Optisch sehr ansprechend, attraktives Hellgrün. In ersten Versuchen 80% Ertrag von Gijnlim.

### Viridas



Anthozyanfreie und rein männliche Sorte. Ertrag eher auf Steiniva Niveau

### Guelph Millennium



Späte Sorte aus Kanada mit hohem Klasse I-Anteil. Kann als Spätsorte auch ein Ersatz für Backlim sein.

### Pacific Purple



Attraktive, violette Stangen als Besonderheit für Direktvermarkter. Anbau wie Grünpargel. Der violette Farbton verschwindet beim Kochen weitestgehend.

### Amaro Montana

Rarität, bisher keine fundierten Ergebnisse im Ertrag, etc. Wilder Spargel, Anbau für hochwertige Nischenproduktion. Kleine, dünne Stangen mit intensivem Geschmack.



**Hochstädter-Direkt**



**Folientunnel**

Mehr Informationen im Internet  
[www.hochstaedter.de](http://www.hochstaedter.de)



**Substratdämme**



**Stellagensysteme**

**Hochstädter-Direkt**

Blackenfeld 26 | 33739 Bielefeld  
 Tel.: 0521/7598160 | Fax: 0521/75981666

# ***Erdbeerpflanzen. Von hegePlanta***

**Gute Qualität und kompetente Beratung durch langjährige Erfahrung.**

Seit 30 Jahren bauen wir in unserem eigenen Obstbaubetrieb erfolgreich Erdbeeren an. Eine wichtige Voraussetzung, um unseren Kunden im Pflanzenvertrieb wertvolle Empfehlungen und eine umfassende Beratung geben zu können.

Um ein gleichmäßiges Qualitätsniveau zu erhalten, arbeiten wir seit Jahren mit dem gleichen, bewährten Lieferantenstamm. In eigenen Versuchen werden jedes Jahr neue Sorten in unserem Betrieb getestet.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum aller aktuellen Sorten, welches Ihnen ermöglicht, Ihre Wunschsorte auf Ihre jeweiligen lokalen und betrieblichen Anforderungen hin anzubauen.

Die Lagerung der Frigopflanzen erfolgt in unseren eigenen Kühlhäusern. Von hier aus treten die Pflanzen ihre Reise zu Ihnen an.

Unsere Kunden schätzen unsere Sortenvielfalt, die gute Qualität des Pflanzmaterials und unsere partnerschaftliche, praxisnahe Unterstützung.





## Neue Sorten im Überblick:

### Dahli

Ist die neue frühe Sorte aus Holland. Der Reifezeitpunkt beginnt vor Clery und zeichnet sich durch gutschmeckende, geformte Früchte aus. Die ertragreiche Frucht zeichnet sich einen hohen Anteil Früchte der Klasse 1 aus.

---

### Verdi (früher FE 1711)

Eine weitere neue Top Sorte von Fresh Forward. Der Geschmack ist angenehm saftig und herzlich süß. FE 1711 liegt im mittleren Reifebereich. Die sehr gute Lagerfähigkeit der Früchte ist ein weiterer Pluspunkt der Sorte.

---

### Rendezvous

Frühe Sorte mit sehr angenehmem, aromatischem süßem Geschmack. Durch die feste Frucht ist Rendezvous für Direktvermarktung, wie auch für den Großhandel optimal geeignet. Weitere Pluspunkte sind die leuchtend roten, attraktiven, und schön glänzenden Früchte und die hohe Ertragsleistung.

---

### Renaissance

Tolle, aus Kreuzungen mit Mieze Schindler und Wilderdbeeren entstandene Geschmackserdbeere. Gesunde, starkwüchsige und winterharte Pflanze. Leider eher etwas dunkle Farbe mit weicheren Früchten, für Direktvermarktung prädestiniert. Darf in keinem Hofladen fehlen.

---

### Lola

Ist eine einmal tragende Pflanze mit Reifezeitpunkt mittel bis spät. Ertrag und Früchte sind sehr hoch, gute Haltbarkeit, guter Geschmack mit ausgeglichenem Zucker-Säure Verhältnis, sehr hoher Ertrag, kompakter aber nicht schwacher Wuchs, offener Pflanzenaufbau, gesunde Pflanzen, sehr winterhart.

---

### Limalexia

Die Sorte zeichnet sich durch einen hohen Ertrag erstklassiger Früchte mit einem sehr aromatischen Geschmack aus. Das frische Aussehen der hellroten Früchte wirkt sehr attraktiv auf die Kunden. Mittlerweile auf Betrieben in allen Anbaugebieten erprobt, wird sie bald zum Standardsortiment der meisten Direktvermarkter zählen. Als „Allrounder“ ist sie ebenso für den Großhandel geeignet. Limalexia kann in allen Anbausystemen eingesetzt werden.



## Erdbeerpflanzen. Sehr frühe Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
				Mai	Juni	Juli	
<b>Flair</b> <b>Reife:</b> 8 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Größe, mittelrot <b>Geschmack:</b> sehr gut <b>Bemerkung:</b> früheste Sorte, höhere Ansprüche an Boden und Düngung <b>Sorteninhaber:</b> Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 8 Tage (Elsanta = 0)
<b>Alba</b> <b>Reife:</b> 6 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> herbizidempfindlich, hoher Ertrag <b>Sorteninhaber:</b> New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
<b>Daroyal®</b> <b>Reife:</b> 6 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, rot bis dunkelrot <b>Geschmack:</b> mittel bis gut <b>Bemerkung:</b> hoher Ertrag, robust, gute Sorte für Selbstpflücke und Direktvermarktung <b>Sorteninhaber:</b> Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
<b>NEU</b> <b>Rendezvous</b> <b>Reife:</b> 4 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Fruchtgröße, leuchtend rote Farbe <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte <b>Sorteninhaber:</b> Hansabred, Deutschland, Auftragsbestätigung und Abrechnung erfolgt durch Vissers B.V.	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
<b>CIVN251 PVR Quicky®</b> <b>Reife:</b> 4 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Fruchtgröße <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> unter dem Laub blühend, gute Befruchtung, daher keine Verkrüppelungen, starke 2. Blüte mit 3 bis 5 Stielen <b>Sorteninhaber:</b> CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
<b>Clery</b> <b>Reife:</b> 4 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Frucht, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> in vielen Gebieten Standard, guter Geschmack <b>Sorteninhaber:</b> CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
<b>NEU</b> <b>Dahli</b> <b>Reife:</b> 4 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Fruchtgröße, mittelrot bis rot <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte <b>Sorteninhaber:</b> Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)





## Erdbeerpflanzen. Frühe Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
<b>Allegro</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
<b>Reife:</b>	3 Tage vor Elsanta				
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	gleichmäßig groß, hellrot, glänzend				
<b>Geschmack:</b>	ausgezeichneter Geschmack, die Früchte sind süß, saftig				
<b>Bemerkung:</b>	für Direktvermarktung und Handel und gut haltbar. Die Fruchthaut ist unempfindlich.				
<b>Sorteninhaber:</b>	Fresh Forward, Niederlande				
<b>Honeoye</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
<b>Reife:</b>	3 Tage vor Elsanta				
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	mittelgroß, mittelrot				
<b>Geschmack:</b>	mittel				
<b>Bemerkung:</b>	verliert an Bedeutung				
<b>Sorteninhaber:</b>	Wageningen, Niederlande				
<b>Rumba</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
<b>Reife:</b>	3 Tage vor Elsanta				
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	sehr großfrüchtig, rot bis dunkelrot				
<b>Geschmack:</b>	mittel				
<b>Bemerkung:</b>	Geschmack mittel, sehr gute Pflückleistung				
<b>Sorteninhaber:</b>	Fresh Forward, Niederlande				
<b>Fleurette</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
<b>Reife:</b>	3 Tage vor Elsanta				
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	großfrüchtig (wie Sonata), orange-rot				
<b>Geschmack:</b>	gut, ähnlich wie Elsanta				
<b>Bemerkung:</b>	hoher Ertrag, für Direktvermarktung und Handel, späte Frigo Pflanzung im Juni sinnvoll				
<b>Sorteninhaber:</b>	Flevo Berry, Niederlande				
<b>Dely</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
<b>Reife:</b>	3 Tage vor Elsanta				
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	mittlere Frucht, mittelrot				
<b>Geschmack:</b>	sehr gut				
<b>Bemerkung:</b>	Waldbeerenaroma, nur für Direktvermarktung				
<b>Sorteninhaber:</b>	CIV, Italien				
<b>Lambada</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Reife:</b>	2 Tage vor Elsanta				
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	mittlere Frucht, rot				
<b>Geschmack:</b>	sehr gut				
<b>Bemerkung:</b>	sehr guter Geschmack, mehltauempfindlich				
<b>Sorteninhaber:</b>	Wageningen, Niederlande				

\*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Allegro



Honeoye



Rumba



Fleurette



Dely



Lambada

## Erdbeerpflanzen. Frühe Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
				Mai	Juni	Juli	
<b>Joly</b> <b>Reife:</b> 2 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> gute Ergänzung zu Clery, guter bis sehr guter Geschmack, regenempfindlich <b>Sorteninhaber:</b> CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Elianny</b> <b>Reife:</b> 2 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Frucht, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> guter Geschmack <b>Sorteninhaber:</b> Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Darselect®</b> <b>Reife:</b> 2 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, mittelrot, schwach glänzend <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> guter Geschmack und Ertrag, alle Vermarktungswege, blütenfrostopfindlich, mehltuanfällig <b>Sorteninhaber:</b> Darbonne, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Aprica</b> <b>Reife:</b> 2 Tage vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere bis große Frucht, rot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> regenfest, blüht unterhalb des Laubes, attraktive, kegelförmige Früchte, Vermarktung über Großhandel. <b>Sorteninhaber:</b> CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Magnum</b> <b>Reife:</b> 1 Tag vor Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> sehr großfrüchtig 24 Gramm, hell bis mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut, hoher Brix Wert <b>Bemerkung:</b> fest mit gutem shelf life, für Direktvermarktung und Handel, bisher gute Ergebnisse in der Traykultur, hoher Kältesummenbedarf <b>Sorteninhaber:</b> Marionnet, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 1 Tage (Elsanta = 0)

\*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Joly



Elianny



Darselect®



Aprica



Magnum

## Erdbeerpflanzen. Mittelfrühe Sorten



Elsanta



Lofty®



Verdi



Limalexia



Lola



Elegance



Polka

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
				Mai	Juni	Juli	
<b>Elsanta</b> <b>Reife:</b> mittelfrüh <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Fruchtgröße, mittelrot <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> verliert im Freiland an Bedeutung <b>Sorteninhaber:</b> es besteht kein Sortenschutz mehr	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
<b>Lofty®</b> <b>Reife:</b> wie Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittleres Fruchtgewicht, leuchtend rot <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> neue Sorte von CIV im Bereich Clery mit gute Fruchteigenschaften <b>Sorteninhaber:</b> CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
<b>Verdi</b> <b>Reife:</b> wie Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> große, bis dunkelrote Früchte <b>Geschmack:</b> sehr gut <b>Bemerkung:</b> hat einen sehr saftigen und herrlich süßen Geschmack <b>Sorteninhaber:</b> Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
<b>Limalexia</b> <b>Reife:</b> wie Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> große Früchte, mittelrot Farbe <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> interessante Spätsorte für den Handel <b>Sorteninhaber:</b> Limgroup, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
<b>Lola</b> <b>Reife:</b> 1 Tag nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere bis große Frucht, fest, glänzend, rot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> die Sorte eignet sich für den Anbau in einem Tunnel oder auf dem Feld <b>Sorteninhaber:</b> Hansabred, Deutschland, Auftragsbestätigung und Abrechnung erfolgt durch Vissers B.V.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	+1 Tage (Elsanta = 0)
<b>Elegance</b> <b>Reife:</b> 1 Tag nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> sehr großfrüchtig, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> Anfälligkeit für Botrytis und Wurzelkrankheiten, Vermarktung nur über LEH <b>Sorteninhaber:</b> Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	+1 Tag (Elsanta = 0)
<b>Polka</b> <b>Reife:</b> 1 Tag nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelgroß, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> im einjährigen Anbau zu empfehlen, guter Geschmack <b>Sorteninhaber:</b> Wageningen, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	+1 Tag (Elsanta = 0)

\*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

## Erdbeerpflanzen. Mittelspäte Sorten

NEU

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
<b>Renaissance</b> <b>Reife:</b> 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> durchschnittliche Fruchtgröße 15-17 g, Festigkeit vergleichbar mit Elsanta, gutes Shelflife <b>Geschmack:</b> außergewöhnlicher Geschmack mit etwas angenehmer Säure <b>Bemerkung:</b> Starkes Wachstum, winterhart, Tolerant zu Phythophthora cactorum, Anthraknose, Spinnmilben, Verticillium und Xanthomonas, leicht anfällig für Erdbeerrüsselkäfer. Geeignet für Freiland, prädestiniert für Direktvermarktung. <b>Lizenzinhaber:</b> Hansabred, Deutschland, Auftragsbestätigung und Abrechnung erfolgt durch Vissers B.V.	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Sonsation</b> <b>Reife:</b> 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> große Früchte, orange-rot <b>Geschmack:</b> sehr gut <b>Bemerkung:</b> ist für Produzenten eine problemlose Sorte <b>Lizenzinhaber:</b> Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Asia</b> <b>Reife:</b> 1 bis 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> sehr großfrüchtig, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> guter Geschmack, für Selbstpflücke und Direktvermarktung, robust, etwas herbizidempfindlich <b>Sorteninhaber:</b> New Fruits, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Deluxe®</b> <b>Reife:</b> 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelgroß, rot, glänzend <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> eignet sich für Freilandanbau, hervorragende Fruchteigenschaften, robuste Pflanze für Nach- und Bioanbau <b>Sorteninhaber:</b> Planasa, Spanien	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Sonata</b> <b>Reife:</b> 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelgroß, mittelrot bis rot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> guter Geschmack, hoher Anteil Klasse 1, manchmal etwas dunkel u. zu weich, Cactorum empfindlich <b>Sorteninhaber:</b> Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Vivaldi</b> <b>Reife:</b> 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> große Frucht, rot, dunkelt aber bei hohen Temperaturen nach, schöner Glanz <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> Ertrag wie Sonata, regenfest, mehltauempfindlich <b>Sorteninhaber:</b> Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■	Mai: ■■■■■ Juni: ■■■■■ Juli: ■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)



Renaissance



Sonsation



Asia



Deluxe®



Sonata



Vivaldi

\*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



## Erdbeerpflanzen. Mittelspäte Sorten



Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			Vergleich Ernte*
				Mai	Juni	Juli	
<b>Korona</b> <b>Reife:</b> 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelgroße Frucht, rot bis dunkelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> klassische Sorte für Direktvermarktung und Selbstpflücke <b>Sorteninhaber:</b> Wageningen, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Roxana</b> <b>Reife:</b> 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, etwas heller als Elsanta <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> sehr guter Ertrag, hervorragend für müde Böden <b>Sorteninhaber:</b> New Fruits, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Figaro</b> <b>Reife:</b> 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> groß, hell <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> für Termin- und Normalkultur, Anfälligkeit für Wurzelkrankheiten <b>Sorteninhaber:</b> Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Matis</b> <b>Reife:</b> 2 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelgroß, rot-orange <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> nicht dicht pflanzen, für alle Vermarktungswege <b>Sorteninhaber:</b> Marionnet, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
<b>Sibilla</b> <b>Reife:</b> 4 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, mittelrot mit rotem Fruchtfleisch <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> Geschmack mittel bis gut, etwas zu weich, für Direktvermarktung und Selbstpflücke <b>Sorteninhaber:</b> CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	+ 4 Tage (Elsanta = 0)

\*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Korona



Roxana



Figaro



Matis



Sibilla

## Erdbeerpflanzen. Späte Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
<b>Fenella</b> <b>Reife:</b> 7 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Fruchtgröße, orange-rot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> sehr produktiv, Geschmack kann stark variieren <b>Sorteninhaber:</b> Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
<b>Salsa</b> <b>Reife:</b> 7 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> große Frucht, rot bis dunkelrot <b>Geschmack:</b> mittel bis gut <b>Bemerkung:</b> robust, hoher Ertrag, für Direktvermarktung und Selbstpflücke <b>Sorteninhaber:</b> Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
<b>Symphony</b> <b>Reife:</b> 7 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> große feste Frucht, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> Phytophthora unempfindliche Sorte, für Direktvertrieb und Handel <b>Sorteninhaber:</b> Mynfield Research, Schottland	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
<b>Jive</b> <b>Reife:</b> 8 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> schwacher Geschmack, keine Direktvermarktung, großfrüchtig während der gesamten Pflücke <b>Sorteninhaber:</b> Fresh Forward, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
<b>Argentera</b> <b>Reife:</b> 8 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> schwacher Geschmack, hoher Ertrag, sehr robust, für Handel geeignet <b>Sorteninhaber:</b> Walter Faedi, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
<b>Laetitia</b> <b>Reife:</b> 8 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Fruchtgröße, rot mit rotem Fruchtfleisch, stark glänzend <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> guter Geschmack und Ertrag, regenfest, außenliegende Nüsschen, höherer Nährstoffbedarf <b>Sorteninhaber:</b> CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)



Fenella



Salsa



Symphony



Jive



Argentera



Laetitia

\*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

## Erdbeerpflanzen. Späte Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
<b>Florence</b> <b>Reife:</b> 10 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> groß, dunkelrot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> hoher Ertrag, teilweise zu dunkel <b>Sorteninhaber:</b> Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
<b>Faith</b> <b>Reife:</b> 10 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, hell rot glänzend <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> Produktiv bei gutem Geschmack, hohe Pflückleistung, vorsorgliche Behandlung gegen Cactorum empfehlenswert, Pflanzdichte: 25 – 28.000 STK/ha <b>Sorteninhaber:</b> Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
<b>Yamaska</b> <b>Reife:</b> 10 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> große, feste Frucht, mittelrot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> hoher Ertrag, Geschmack mittel, Befruchtersorte erforderlich <b>Sorteninhaber:</b> Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
<b>Christina</b> <b>Reife:</b> 10 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> sehr großfrüchtig, mittelrot <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> an geeigneten Standorten auch für längere Vermarktungswege verwendbar, sonst aber eher für die Direktvermarktung, herbizidempfindlich <b>Sorteninhaber:</b> Uni Ancona, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)

\*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Florence



Faith



Yamaska



Christina

## Erdbeerpflanzen. Sehr späte Sorten



Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit	Vergleich Ernte*
<b>Susette</b> <b>Reife:</b> 14 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelgroß (ähnlich Elsanta), hellrot, kein Nachdunkeln <b>Geschmack:</b> mittel bis gut <b>Bemerkung:</b> sehr helle Frucht, Für LEH Belieferung <b>Sorteninhaber:</b> Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 14 Tage (Elsanta = 0)
<b>Magnus</b> <b>Reife:</b> 20 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> hellrote, mittlere Früchte <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> Ertrag ist etwas höher als bei Malwina <b>Sorteninhaber:</b> Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 20 Tage (Elsanta = 0)
<b>Malwina</b> <b>Reife:</b> 21 Tage nach Elsanta <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, dunkelrot <b>Geschmack:</b> sehr gut <b>Bemerkung:</b> späteste Sorte, sehr guter Geschmack, anspruchsvoll beim Pflanzenschutz (Thripse und Blütenstecher!) und Düngung (kein hohes N-Niveau!) <b>Sorteninhaber:</b> Peter Stoppel, Kressbronn, Auftragsbestätigung und Abrechnung erfolgt durch Vissers B.V.	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Mai: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juni: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Juli: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 21 Tage (Elsanta = 0)

\*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg



Susette



Magnus



Malwina



## Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten



Evie II



Vivara®



Harmony®  
„P061103V“



Verity



Triumph



Florentina

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
<b>Evie II</b>  <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> groß, mittelrot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> hoher Ertrag, regenempfindlich <b>Sorteninhaber:</b> Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Vivara®</b>  <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Fruchtgröße, rot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> für den Freilandanbau geeignet, Vermarktung über LEH <b>Sorteninhaber:</b> CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Harmony®</b> <b>„P061103V“</b>  <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittlere Fruchtgröße mit 20 Gramm, stark glänzend <b>Geschmack:</b> mittel bis gut <b>Bemerkung:</b> wenig anfällig für Mehltau, Botrytis und Cactorum, erfordert höheres EC Niveau, für Substrat und Freiland, Auftragsbestätigung durch Vissers B.V. <b>Sorteninhaber:</b> Vissers Aardbeiplanten B.V., Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Verity</b>  <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelgroßfrüchtig, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> mit guten Ergebnissen in der Substratkultur und im geschützten Anbau, Vermarktung über Frank van Alphen <b>Sorteninhaber:</b> Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Triumph</b>  <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, hellrot <b>Geschmack:</b> mittel <b>Bemerkung:</b> hohes Ertragspotential, Vermarktung über LEH, für geschützten Anbau <b>Sorteninhaber:</b> Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Florentina</b>  <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelrot, glänzend <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> der Geschmack der Früchte ist süß sauer aber gut <b>Sorteninhaber:</b> Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

## Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
<b>Prize</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	großfrüchtig, mittelrot, nicht hell						
<b>Geschmack:</b>	gut						
<b>Bemerkung:</b>	behält Fruchtgröße während der Pflücke bei, gutes Ertragspotential 1,0 bis 1,2 kg/Pflanzen, für geschützten Anbau						
<b>Sorteninhaber:</b>	Plant Sciences inc., USA						
<b>Arabella</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	mittlere Fruchtgröße, kegelförmig, attraktives mittelrot						
<b>Geschmack:</b>	gut bis sehr gut						
<b>Bemerkung:</b>	ausgezeichnetes Aroma, mittlerer Ertrag ca. 0,8 kg/Pflanze gut haltbar, Für geschützten Anbau						
<b>Sorteninhaber:</b>	Plant Sciences inc., USA						
<b>Sweet Eve</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	mittelgroße Früchte, mittelrot						
<b>Geschmack:</b>	sehr gut, Waldbeerenaroma						
<b>Bemerkung:</b>	nur geschützter Anbau, guter Geschmack, im Substrat ausreichend Ertrag						
<b>Sorteninhaber:</b>	Edward Vinson, England						



Prize



Arabella



Sweet Eve

Immertragende Sorten im Überblick

Sorte/Sorteninhaber	Direktmarkt	Selbstpflücke	Versand	Geschmack	Produktivität
<b>Evie II</b> , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Vivara</b> ®, CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Malga</b> , New Fruits, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Harmony „P061103V“</b> , Vissers Aardbeiplanten B.V., NL	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Verity</b> , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Triumph</b> , Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Florentina</b> , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Prize</b> , Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Arabella</b> , Plant Sciences inc., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Sweet Eve</b> , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Portola</b> , Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Murano</b> ®, CIV, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Furore</b> , Flevo Berry, Niederlande	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Anabelle</b> , Angier, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Cabrillo</b> , Eurosemillas S.A., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Eves Delight</b> , Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>San Andreas</b> , Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Weitere Sorten auf Anfrage.

sehr gut ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    gut ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    mittel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    möglich ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■    weniger ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

## Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten



Portola



Murano®



Furore

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
<b>Portola</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	groß, mittelrot						
<b>Geschmack:</b>	mittel						
<b>Bemerkung:</b>	hoher Ertrag, für Großhandel						
<b>Sorteninhaber:</b>	Uni California, USA						
<b>Murano®</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	großfrüchtig, mittelrot						
<b>Geschmack:</b>	gut						
<b>Bemerkung:</b>	guter Geschmack, sehr gutes Shelf Life, gute Ergebnisse in der Substratkultur, zählt zu den Hauptsorten						
<b>Sorteninhaber:</b>	CIV, Italien						
<b>Furore</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Fruchtgröße/Farbe:</b>	hellrote Frucht, mittlere Größe						
<b>Geschmack:</b>	gut						
<b>Bemerkung:</b>							
<b>Sorteninhaber:</b>	Flevo Berry, Niederlande						

**NEU**

### Besonderheiten

- hoher Ertrag, regenempfindlich
- gute Fruchtgröße und Festigkeit, hoher Ertrag, Freiland und Substrat
- großfrüchtig, fest, mittlerer Geschmack, Freiland und Substrat
- guter Geschmack und Ertrag, höherer Düngebedarf
- mit guten Ergebnissen in der Substratkultur und im geschützten Anbau
- sehr guter Ertrag, für Grosshandelsvermarktung
- der Geschmack der Früchte ist süß sauer aber gut
- sehr gute Allroundsorte, etwas dunkle Frucht, Substratanbau
- sehr guter Geschmack, Substratanbau
- nur geschützter Anbau, guter Geschmack, im Substrat ausreichender Ertrag
- hoher Ertrag, für Großhandel
- hohe Kältesumme erforderlich, hoher Ertrag und guter Geschmack, stabile Frucht
- kann in allen Anbausystemen verwendet werden
- ideal für Direktvermarktung, Waldbeerengeschmack
- feste Frucht mit gutem Shelf life, Ertrag besser, jedoch im Geschmack etwas schwächer als San Andreas, für Substrat und Freiland
- nur im geschützten Anbau, guter Geschmack, spätere Hauptreife
- guter Geschmack, verzögerte Hauptreife, feste Frucht

### Reifezeiten

Juli	August	September	Oktober
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

	Sorte/Sorteninhaber	Direktmarkt	Selbstpflücke	Versand	Geschmack	Produktivität	
Sehr frühe Sorten	<b>Flair</b> , Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Alba</b> , New Fruits, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Daroyal</b> ®, Darbonne, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Rendezvous</b> , Hansabred, Deutschland	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>CIVN251 PVR Quicky</b> ®, CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Clery</b> , CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Lofty</b> ®, CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
<b>Dahli</b> , Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■		
Frühe Sorten	<b>Allegro</b> , Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Honeoye</b> , Wageningen, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Rumba</b> , Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Fleurette</b> , Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Dely</b> , CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Lambada</b> , Wageningen, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Joly</b> , CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Premy PVR</b> , CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Darselect</b> ®, Darbonne, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Aprica</b> , CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Magnum</b> , Marionnet, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
Mittelfrühe Sorten	<b>Elsanta</b> , Sortenschutz beendet	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Verdi</b> , Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Limalexia</b> , Limgroup, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Lola</b> , Hansabred, Deutschland	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Elegance</b> , Meiosis, England	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Polka</b> , Wageningen, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
Mittelspäte Sorten	<b>Renaissance</b> , Hansabred, Deutschland	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Sonsation</b> , Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Asia</b> , New Fruits, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Deluxe</b> ®, Planasa, Spanien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Sonata</b> , Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Vivaldi</b> , Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Korona</b> , Wageningen, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Roxana</b> , New Fruits, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Figaro</b> , Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Matis</b> , Marionnet, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Sibilla</b> , CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
Späte Sorten	<b>Fenella</b> , Meiosis, England	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Salsa</b> , Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Symphony</b> , Mylnefield RS, Schottland	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Jive</b> , Fresh Forward, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Argentera</b> , Walter Faedi, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Laetitia</b> , CIV, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Florence</b> , Meiosis, England	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Faith</b> , Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Yamaska</b> , Meiosis, England	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	<b>Christina</b> , Uni Ancona, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
	Sehr späte Sorten	<b>Susette</b> , Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
		<b>Magnus</b> , Flevo Berry, Niederlande	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
<b>Malwina</b> , Peter Stoppel, Kressbronn		■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	

Weitere Sorten auf Anfrage.

sehr gut ■■■■■ gut ■■■■■ mittel ■■■■■ möglich ■■■■■ weniger ■■■■■

Besonderheiten

Reifezeiten

Vergleich Ernte\*

	Mai	Juni	Juli	
früheste Sorte, besondere Ansprüche an Düngung und Bodenverhältnisse, sehr guter Geschmack	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 8 Tage (Elsanta = 0)
Herbizid anfällig, hoher Ertrag	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
für Direktvermarktung und Selbstpflücke, dunkelrot, robuste Sorte mit hohem Ertrag	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 6 Tage (Elsanta = 0)
hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
vor Clery reifend (wie Alba oder sogar Flair), guter Geschmack, etwas längliche Fruchtform	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
in vielen Gebieten Standard, guter Geschmack	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
neue Sorte von CIV im Bereich Clery mit gute Fruchteigenschaften	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
hoher Prozentsatz, Klasse 1 Früchte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 4 Tage (Elsanta = 0)
für Direktvermarktung und Handel und gut haltbar, die Fruchthaut ist unempfindlich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
verliert immer mehr an Bedeutung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
sehr gute Pflückleistung, Geschmack mittel	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
guter Ertrag, gut zum Verfrühen geeignet, für alle Absatzwege geeignet	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
Waldbeerenaroma, nur für Direktvermarktung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 3 Tage (Elsanta = 0)
sehr guter Geschmack, sehr mehltauanfällig, sehr weiche Frucht	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
gute Ergänzung zu Clery, guter bis sehr guter Geschmack, regenempfindlich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
sehr wüchsige Pflanze, guter Geschmack, regelmäßige Früchte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tag (Elsanta = 0)
guter Geschmack, für alle Vermarktungswege, blütenfrostempfindlich, mehltauanfällig	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tag (Elsanta = 0)
regenfest, blüht unterhalb des Laubes, attraktive und kegelförmige Früchte, LEH Belieferung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 2 Tage (Elsanta = 0)
sehr großfrüchtig, guter bis sehr guter Geschmack, für alle Absatzwege geeignet	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	- 1 Tage (Elsanta = 0)
verliert an Bedeutung, da die kleine Fruchtgröße zu schwachen Pflückleistungen führt	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
hat einen sehr saftigen und herrlich süßen Geschmack	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
interessante Spätsorte für den Handel	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	0 Tage (Elsanta = 0)
leicht zu pflücken, hoher Ertrag, Geschmack ist gut, guten Balance zwischen süß und sauer	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 1 Tage (Elsanta = 0)
sehr guter Ertrag, sehr gute Optik, gute Haltbarkeit, wegen Geschmack aber keine Direktvermarktung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 1 Tage (Elsanta = 0)
im einjährigen Anbau für die Direktvermarktung oder Selbstpflücke, guter Geschmack	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 1 Tage (Elsanta = 0)
starkes Wachstum, winterhart, leicht anfällig für Erdbeerrüsselkäfer, gut für Direktvermarktung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
ist für Produzenten eine problemlose Sorte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, für Selbstpflücke und Direktvermarktung, robuste Pflanze, herbizidempfindlich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
robuste Sorte mit Eignung für Bioanbau und Nachbau, guter bis sehr guter Geschmack	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, hoher Anteil Klasse 1, manchmal etwas dunkel u. zu weich, Cactorum empfindlich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack, mehltauempfindlich, dunkelt nach	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
klassische Sorte für Direktvermarktung und Selbstpflücke	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
sehr guter Ertrag, hervorragend für müde Böden, nicht für Direktvermarktung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
hellere Frucht als Sonata, jedoch anfällig für Wurzelkrankheiten	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
nicht dicht pflanzen, für alle Vermarktungswege	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 2 Tage (Elsanta = 0)
Geschmack mittel bis gut, etwas zu weich, für Direktvermarktung und Selbstpflücke	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 4 Tage (Elsanta = 0)
hoher Ertrag, langes Erntefenster, Geschmack je nach Anbauverhältnissen nicht immer befriedigend	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
robust, hoher Ertrag, für Direktvermarktung und Selbstpflücke	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
Phytophthora unempfindliche Sorte, eher für den Handel geeignet	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 7 Tage (Elsanta = 0)
schwacher Geschmack, keine Direktvermarktung, großfrüchtig während der gesamten Pflücke	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
hoher Ertrag, sehr robust, für Handel geeignet	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
guter Geschmack und Ertrag, regenfest, außenliegende Nüsschen, höherer Nährstoffbedarf	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 8 Tage (Elsanta = 0)
hoher Ertrag, zu dunkel	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
produktiv bei gutem Geschmack, hohe Pflückleistung, vorsorgliche Behandlung gegen Cactorum	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
Befruchtersorte erforderlich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
sehr großfrüchtig, guter Geschmack, herbizidempfindlich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 10 Tage (Elsanta = 0)
sehr helle Frucht, für LEH Belieferung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 14 Tage (Elsanta = 0)
Ertrag ist etwas höher als bei Malwina	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 20 Tage (Elsanta = 0)
späteste Sorte, sehr guter Geschmack, anspruchsvoll beim Pflanzenschutz (Thripse und Blütenstecher!) und Düngung (kein hohes N-Niveau!)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	+ 21 Tage (Elsanta = 0)

\*Vergleich Elsanta = 0, gilt für Wert ohne Verfrühungsmethoden, Standort Ladenburg

## Erdbeerpflanzen. Immertragende Sorten

Sorte	Ertrag	Geschmack	Haltbarkeit	Erntezeit			
				Juli	August	September	Oktober
<b>Anabelle</b> <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> klein bis mittelfrüchtig, mittelrot <b>Geschmack:</b> sehr gut, Waldbeerenaroma <b>Bemerkung:</b> ideal für Direktvermarktung, Waldbeerengeschmack <b>Sorteninhaber:</b> Angier, Frankreich	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Cabrillo</b> <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, mittelrot, nicht hell <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> feste Frucht mit gutem Shelf Life, Ertrag besser, jedoch im Geschmack etwas schwächer als San Andreas, für Substrat und Freiland <b>Sorteninhaber:</b> Eurosemillas S.A., USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Eves Delight</b> <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> große feste Frucht, mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> nur geschützter Anbau, guter Geschmack, spätere Hauptreife <b>Sorteninhaber:</b> Edward Vinson, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>San Andreas</b> <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, mittelrot bis rot <b>Geschmack:</b> mittel bis gut <b>Bemerkung:</b> guter Geschmack, verzögerte Hauptreife, fest <b>Sorteninhaber:</b> Uni California, USA	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anabelle



Cabrillo



Eves Delight



San Andreas

# Pflanzentypen

## **Frigopflanzen:**

### **B Pflanzen**

6 bis 7/8mm, Verwendung als Pflanzmaterial zum Topfen.  
Meist 800 bis 1200 STK/Kiste, bei guter Kulturführung auch als  
Direktpflanzung möglich.

### **A minus Pflanzen**

7 bis 9mm, Freilandpflanzung mit frühem Pflanztermin,  
Ausknipsen der Blüten, keine Beerntung im Pflanzjahr vorgesehen.  
Meist 700 STK/Kiste.

### **Standard A Pflanzen**

je nach Herkunft 9 bis 12 mm bzw. 9 bis 13/14mm, eine Beerntung im  
Pflanzjahr ist möglich, jedoch werden im Pflanzjahr meistens die Blüten  
ausgeknipst, um das volle Ertragspotential im Folgejahr sicherzustellen.  
Meist 500 bis 600 STK/Kiste.

### **A+ Pflanzen**

Beerntung im Pflanzjahr möglich. Gängigste Sortierung für die Terminkultur.  
13 – 17mm, 250 – 350 STK/Kiste.

### **Sehr starke A++ Pflanzen**

über 18mm Rhizom Durchmesser, Pflanzung nur bis Mai sinnvoll,  
bei späteren Terminen besteht die Gefahr von Ertragseinbußen.  
Meist 150 bis 200 STK/Kiste.

### **Minitrays**

weiterkultivierte Topfpflanze mit etwas kleinerem Topfdurchmesser,  
etwas kostengünstigere Traypflanze für die Gewächshaus-Terminkultur.  
Meist ca. 100 STK/Kiste.

### **Traypflanzen**

weiterkultivierte Topfpflanze in 3 verschiedenen Stärken mit hohem  
Ertragspotential für die Gewächshauskultur. Meist ca. 60 STK/Kiste.

### **Wartebeetpflanzen**

weiterkultivierte Grünpflanzen, 3 verschiedene Größensortierungen,  
satzweiser Anbau im Freiland, um ab Anfang Mai bis Oktober Erdbeeren  
zu produzieren. Meist 60 bis 90 STK/Kiste.

## **Grünpflanzen:**

wurzelnackte Grünpflanzen, Pflanztermin bis Ende August,  
Überkopfberegnung notwendig. Meist 200 bis 250 STK/Kiste.

## **Topfpflanzen:**

Pflanztermin bis Ende August, Tropfbewässerung meist ausreichend.  
Meist ca. 60 STK/Styropor oder Plastiktray.

# Himbeerpflanzen

Unser Sortiment an Himbeerpflanzen deckt alle aktuellen Sorten für die verschiedenen Anbauarten und Pflanzmethoden ab. Gerne helfen wir Ihnen weiter, wenn Sie Fragen zu Sortenwahl oder Anbaumethoden haben.

<b>Sommerhimbeeren</b>		Ruten	getopfte Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	überwinternde Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	Long Canes
	Glen Moy		X		
	Malahat		X	X	
	Willamette		X	X	
	Rubaca		X	X	
	Glen Ample	X	X	X	X
	Chemainus	X	X		
	Tulameen	X	X	X	X
	Schönemann	X			
	Octavia	X	X	X	
Glen Dee	X	X	X		
Weiß-Rula		X	X		

<b>Herbsthimbeeren (Remonten)</b>		Ruten	getopfte Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	überwinternde Grünpflanzen 4 cm Durchmesser	Long Canes
	Autumn Bliss	X	X	X	
	Polka	X	X	X	
	Tulamagic		X		
	Ruby Fall		X	X	
	Enrosadira®		X		
	Amira		X		
	Sugana		X		
	Primalba		X	X	
	Regina		X		
	Himbotop	X	X		
	Erika		X		
	Versailles		X		
	Paris		X		
	Alpengold		X	X	



Bitte beachten Sie die unterschiedliche Verfügbarkeit der einzelnen Sorten auf Seite 29. Weitere Sorten auf Anfrage.



NEU



Diese neue herbsttragende Sorte ist eine italienische Züchtung. Ihre interessantesten Merkmale sind die Frühzeitigkeit und der gute Geschmack. Die mittelroten Früchte sind gross. Die Pflanze bringt Blütentreibe annähernd über die gesamte Rutenlänge. Bei der Kulturführung ist auf eine ausreichende Düngung zu achten. Da Primalba (s) nicht sehr starkwüchsig ist, eignet sich nur für die Herbsterte, nicht für eine Doppelernte

Anzeige

# WACHSTUMSERFOLG.

IHR BETRIEB, UNSERE SUBSTRATLÖSUNGEN –  
FÜR ERDBEEREN, HIMBEEREN  
UND HEIDELBEEREN!

**Flora**  **gard**®

[www.floragard.de](http://www.floragard.de)

**Floragard Vertriebs-GmbH**

Gerhard-Stalling-Str. 7 | 26135 Oldenburg

Tel: +49 (0)4 41/20 92-0 | [info@floragard.de](mailto:info@floragard.de)

## Sommerhimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
<b>Niniane® rubaca (s)</b>  <b>Blüte:</b> mittelfrüh (Anfang Juni) <b>Haupternte:</b> mittelfrüh (Anfang Juli) <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> kleinfrüchtig, mittelrot, mäßig glänzend <b>Geschmack:</b> gut, süßlich aromatisch, mittelsaftig <b>Bemerkung:</b> resistent gegen Wurzelfäulen, geringe Anfälligkeit für Rutenkrankheiten <b>Sorteninhaber:</b> TU München, Lehrstuhl für Obstbau	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Glen Ample</b>  <b>Blüte:</b> mittelfrüh bis spät (Anfang/Mitte Juni) <b>Haupternte:</b> mittelfrüh (Anfang Juli), sommertragend <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, hellrot, dunkeln nicht nach <b>Geschmack:</b> mittel bis gut, säuerlich, schwaches Aroma <b>Bemerkung:</b> lange Ernteperiode, geringe Anfälligkeit für Botrytis <b>Sorteninhaber:</b> SCRI, Schottland	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Tulameen</b>  <b>Blüte:</b> mittelfrüh (Anfang Juni) <b>Haupternte:</b> mittelfrüh bis spät (Anfang/Mitte Juli) <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, mittelrot, stark glänzend <b>Geschmack:</b> gut, süßlich aromatisch <b>Bemerkung:</b> starke Anfälligkeit für Rutenkrankheiten, mittlerer Ertrag <b>Sorteninhaber:</b> PARC Breeding Program, Kanada	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Glen Dee</b>  <b>Blüte:</b> spät (Anfang Juni) <b>Haupternte:</b> spät (bis Ende Juli) <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittel- bis großfrüchtig, 5 bis 6 Gramm <b>Geschmack:</b> mittel bis gut <b>Bemerkung:</b> hoher Ertrag <b>Sorteninhaber:</b> James Hutton Institute, England	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■



Niniane® rubaca (s)



Glen Ample



Tulameen



Glen Dee

## Herbsthimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
<b>Autumn Bliss</b> <b>Blüte:</b> früh (Anfang Juli) <b>Haupternte:</b> früh bis sehr früh (Ende Juli/Anfang August) <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelgroß, vollreif dunkelrot <b>Geschmack:</b> mittel, süßsauerlich mit gutem Aroma <b>Bemerkung:</b> mittellange Ernte, anfällig für Spinnmilben, weniger anfällig für Rutenkrankheiten <b>Sorteninhaber:</b> Meiosis, England	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Polka</b> <b>Blüte:</b> früh (Anfang Juli) <b>Haupternte:</b> früh (Anfang August) <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> groß, mittel- bis dunkelrot, stark glänzend <b>Geschmack:</b> gut, aromatisch <b>Bemerkung:</b> gut pflückbar <b>Sorteninhaber:</b> Institut Brezina, Polen	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Tulamagic</b> <b>Blüte:</b> Frühjahr: sehr früh (Anfang Mai), Herbsterte Mitte Juli <b>Haupternte:</b> sehr früh (Anfang August) <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> für Direktvermarktung empfehlenswert, stark bedornt <b>Sorteninhaber:</b> Promo Fruit, Schweiz	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Rubyfall</b> <b>Blüte:</b> früh (Anfang Juli) <b>Haupternte:</b> früh (Anfang August) <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, dunkelrot, glänzend <b>Geschmack:</b> gut, aromatisch <b>Bemerkung:</b> Kreuzung Polka x Tulameen, dornelos <b>Sorteninhaber:</b> Trentino, Italien	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Autumn Bliss



Polka



Tulamagic



Rubyfall

## Herbsthimbeeren

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
<b>Amira</b> <b>Blüte:</b> Frühjahr: sehr früh (Anfang Mai), Herbsterte Anfang Juli <b>Haupternte:</b> an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> sehr großfrüchtig, 7 Gramm, mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> 2 Ernten pro Jahr, für Direktvermarktung, Erziehung notwendig <b>Sorteninhaber:</b> Maddalena Grisenti, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
<b>Enrosadira®</b> <b>Blüte:</b> früh (Anfang Juli) <b>Haupternte:</b> früh (Anfang August) <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, 5 Gramm, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> Herbsterte 3 bis 5 Tage vor Polka, Frühjahrsernte Ende Mai <b>Sorteninhaber:</b> Vivai Molari, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
<b>Sugana</b> <b>Blüte:</b> Frühjahr: früh (Mai), Herbsterte Mitte Juli <b>Haupternte:</b> am 2-jährigem Holz Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, hell- bis mittelrot <b>Geschmack:</b> mittel bis gut, aromatisch <b>Bemerkung:</b> 2 mal tragend, wenig anfällig <b>Sorteninhaber:</b> Lubera, Schweiz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
<b>NEU Primalba</b> <b>Blüte:</b> Frühjahr: früh (Mai), Herbsterte Mitte Juli <b>Haupternte:</b> am 2-jährigem Holz Juni, an 1-jährigem Holz Mitte August <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelrote, große Früchte <b>Geschmack:</b> gut <b>Bemerkung:</b> ist momentan die früheste reifende Herbsthimbeere auf dem Markt <b>Sorteninhaber:</b> Berryplant, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■



Amira



Enrosadira®



Sugana



Primalba

## Herbsthimbeeren



Regina



Himbo-Top



Versailles



Paris



Alpengold

Sorte	Ertrag	Größe	Haltbarkeit	Erntezeit				
				Juni	Juli	August	September	Oktober
<b>Regina</b> <b>Blüte:</b> Frühjahr: früh (Anfang Mai), Herbsterte Anfang Juli <b>Haupternte:</b> an 2-jährigem Holz Anfang Juni, an 1-jährigem Holz Mitte/Ende August <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, mittelrot <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut <b>Bemerkung:</b> Fruchtgröße 7 Gramm, Direktvermarktung, Spalier notwendig <b>Sorteninhaber:</b> Maddalena Grisenti, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
<b>Himbo-Top</b> <b>Blüte:</b> mittel bis spät (Anfang bis Mitte Juni) <b>Haupternte:</b> mittel bis spät (Mitte August), an 2-jährigem Holz auch im Juni <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> groß, gleichmäßig mittelrot <b>Geschmack:</b> gut, süßsauerlich, gutes Aroma <b>Bemerkung:</b> lange Ruten, Spalierziehung notwendig, wenig anfällig für Rutenkrankheiten <b>Sorteninhaber:</b> Promo Fruit, Schweiz	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
<b>Versailles</b> <b>Blüte:</b> spät (Anfang Juni) <b>Haupternte:</b> spät (Anfang August), Doppelernte möglich <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> sehr großfrüchtig, 10 bis 12 Gramm <b>Geschmack:</b> mittel bis gut <b>Bemerkung:</b> kurze Lateraltriebe, hellfrüchtig, Berechnung und Belieferung durch Marionnet <b>Sorteninhaber:</b> Marionnet, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
<b>Paris</b> <b>Blüte:</b> spät (Anfang Juni) <b>Haupternte:</b> spät (Anfang August), Doppelernte möglich <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> großfrüchtig, 6 bis 7 Gramm <b>Geschmack:</b> mittel bis gut <b>Bemerkung:</b> helle, attraktive Frucht, guter Geschmack, Berechnung und Belieferung durch Marionnet <b>Sorteninhaber:</b> Marionnet, Frankreich	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
<b>Alpengold</b> <b>Blüte:</b> mittel (Anfang Juni) <b>Haupternte:</b> mittel bis spät (Mitte August) <b>Fruchtgröße/Farbe:</b> mittelgroß, intensiv gelb <b>Geschmack:</b> gut bis sehr gut, süßsauerlich mit gutem Aroma <b>Bemerkung:</b> zitronengelbe Herbsthimbeere <b>Sorteninhaber:</b> Trentino, Italien	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

## Himbeeren Reifezeit

	Juni	Juli	August	September	Oktober
Sommertragende Sorten	Glen Moy	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Malahat	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Willamette	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Meeker	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Ninane®rubaca	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Korpiko	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Glen Ample	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Chemainus	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Tulameen	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Cascade Delight	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Schönemann	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Tadmor	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Octavia	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Glen Dee	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Wei-Rula	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Herbsttragende Sorten	Primalba	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Polka	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Tulamagic	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Ruby Fall	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Amira	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Enrosadira®	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Sugana	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Regina	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Himbo-Top	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Erika	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Versailles	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
	Paris	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Alpengold	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	

Weitere Sorten auf Anfrage.



### Himbeerpflanzen sind lieferbar als:

- 1 jährige Ruten** Aus virusfreien Mutterpflanzen, Auslieferung während der Winterruhe (November - Februar).
- Getopfte Grünpflanzen** Aus frisch getopften Stecklingen oder aus Meristemvermehrung, diese Pflanzen sind noch frostempfindlich und werden erst nach den Eisheiligen ausgeliefert.
- Überwinterte getopfte Grünpflanzen** Das Topfen erfolgt im August, der Aufwuchs und das Abhärten erfolgen im Freien, danach werden die Pflanzen geschützt überwintert. Die Pflanzen sind nicht frostempfindlich und können schon Anfang März im Freiland gepflanzt werden. Die neuen Ruten bekommen dadurch einen Wachstumsvorsprung von gut 8 Wochen.
- Long Canes** Getopfte Grünpflanzen werden Mitte Mai in 1,5l Töpfen im Freiland zur endgültigen Höhe von ca. 1,8m hochgezogen. Danach werden die Pflanzen zu Beginn des Winters bei -2 Grad eingelagert, um Sie dann als Terminkultur im folgenden Frühjahr/Sommer zu nutzen.

## Pflanzen von hegePlanta.

### Erfolg mit Himbeer Long Canes

Eine Terminierung der Himbeerernte ist durch den Einsatz sogenannter Long Canes möglich. Bei Long Canes werden meist 2 Pflanzen pro 1,8l/Topf im Vorjahr auf ca 1,8 Meter hochgezogen und mit Eintreten der Winterruhe bei – 2 Grad Celsius gekühlt gelagert. Im Folgejahr können diese Pflanzen, ähnlich wie Frigo Erdbeerpflanzen zu verschiedenen Terminen ausgepflanzt werden.

Je nach Pflanztermin lassen sich verschiedene Erntetermine erreichen. Abhängig vom Zeitpunkt beginnt die Ernte 70 bis 90 Tage nach dem Auspflanzen. Ein früher Pflanztermin lässt sich nur im geschützten Anbau realisieren. Dazu werden die Töpfe ca. Mitte Februar ausgepflanzt. Die 2-jährigen Ruten werden in 7,5 l Töpfe umgetopft und an einem 3- bis 4-reihigen Drahtgerüst fixiert. Die Wasser- und Düngerversorgung erfolgt über Einzeltrichter. Zum Abstützen der Lateraltriebe werden seitlich sogenannte Chrysanthemen-Netze gespannt, durch die die Triebe wachsen und so nicht abknicken können. Die Beerntung fängt in diesem Fall ab Mitte Mai an. Eine Ernteleistung von 5 kg pro Stunde ist realistisch.

Durch das staffelweise Auspflanzen von mehreren Sätzen von Mitte Februar bis Mitte Mai kann die lückenlose Ernte von Juni bis Oktober erreicht werden.

Wir empfehlen eine rechtzeitige Bestellung, die zum Teil bei 12 Monaten oder noch früher vor dem Liefertermin liegen kann.



### Schlussfolgerung

Die Wirtschaftlichkeit ist stark von der jeweiligen Marktsituation und dem erzielten Ertrag abhängig, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Betrieben, die erfolgreich mit dieser Anbaumethode arbeiten.



### Kulturreckdaten

(Beispiel aus unserer Produktion)

**Folientunnelbreite:** 8,0 m

**Reihenabstand:** 2,5 m

**Reihenanzahl pro Tunnel:** 3

**Töpfe laufender Meter:** 3

**Ruten laufender Meter:** 6

**Pflanzbedarf/ha:** 11 000 Töpfe  
bzw. 22 000 Ruten

**Ertrag pro Rute:**  
700 bis 1200 Gramm

**Ertrag/ha:** 16 bis 28 t

(Beispiel Pflanzbedarf)

900 Töpfe mit je 2 Ruten,  
Tunnel 100 m x 8,0 m,  
3 reihig

# Brombeeren

Die Sorte Loch Ness bleibt weiterhin die Hauptsorte im Erwerbsanbau. 2 Wochen früher reift Loch Tay, jedoch ist diese Sorte deutlich ertragsschwächer. Spätere Sorten sind Navaho und Chester, die aber je nach Anbauggebiet weniger Ertrag bringen, da nicht mehr alle Früchte ausreifen. Neu im Sortiment und sehr interessant ist Asterina®. Die Sorte zeichnet sich durch eine frühzeitige Zuckerbildung bereits vor der Vollreife und durch ein langes Erntefenster aus.

## Loch Tay

<b>Reifezeit:</b>	früh (Anfang Juli – Anfang/Ende August)
<b>Frosthärte:</b>	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
<b>Ertrag:</b>	ähnlich Karaka Black
<b>Fruchtgröße:</b>	mittel bis groß (7 Gramm)
<b>Bemerkung:</b>	sehr guter Geschmack, anfällig für Brombeermehltau



Loch Tay

## Loch Ness

<b>Reifezeit:</b>	mittelfrüh (Mitte Juli – Mitte/Ende August) 2 Wochen nach Loch Tay
<b>Frosthärte:</b>	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
<b>Ertrag:</b>	gut
<b>Fruchtgröße:</b>	groß (8 Gramm)
<b>Bemerkung:</b>	guter Geschmack, anfällig für Brombeermehltau



Loch Ness

## Asterina®

<b>Reifezeit:</b>	mittel, (Mitte Juli – Ende August) langes Fenster, bis zu 1 Woche nach Chester endend.
<b>Frosthärte:</b>	mittlere Empfindlichkeit wie Loch Ness
<b>Ertrag:</b>	fast wie Loch Ness, etwas weniger Behang, aber deutlich größere Früchte
<b>Fruchtgröße:</b>	sehr groß (8-10, teils 11 Gramm)
<b>Bemerkung:</b>	sehr gute Pflückleistung, hervorragende Festigkeit, widerstandsfähiger gegen Mehltau im Vergleich zu den bisherigen Hauptsorten, zuckersüß, Sorteninhaber: Promo Fruit AG, Schweiz



Asterina®

## Navaho

<b>Reifezeit:</b>	mittel (Ende Juli – Mitte/Ende September), 1 Woche nach Loch Ness
<b>Frosthärte:</b>	mittlere bis hohe Empfindlichkeit
<b>Ertrag:</b>	mittlerer Ertrag (zwischen Loch Tay und Loch Ness)
<b>Fruchtgröße:</b>	sehr groß (10 Gramm)
<b>Bemerkung:</b>	aufrecht wachsend, deswegen enger pflanzen, sehr wüchsig, feste Beeren mit gutem Geschmack



Navaho

## Chester Thornless

<b>Reifezeit:</b>	mittel (Ende Juli – Ende August), 1 Woche nach Asterina
<b>Frosthärte:</b>	hohe Empfindlichkeit gegen Holzfrost
<b>Ertrag:</b>	hoher Ertrag, höher als Loch Ness
<b>Fruchtgröße:</b>	groß (7 Gramm) wie Loch Tay
<b>Bemerkung:</b>	geschmacklich nicht an die frühen Sorten heranreichend sehr wüchsig, feste Beeren



Chester Thornless

## Reuben

<b>Reifezeit:</b>	spät (Ende August – Mitte Oktober)
<b>Frosthärte:</b>	trägt bereits am 1-jährigen Holz, dadurch keine Frostgefahr im 1. Erntejahr
<b>Ertrag:</b>	mittlerer Ertrag
<b>Fruchtgröße:</b>	groß bis sehr groß (7 bis 9 Gramm)
<b>Bemerkung:</b>	remontierende Brombeere



Reuben



## **Pflanzen von hegePlanta. Erfolg mit Brombeeren Long Canes**

Ähnlich wie Himbeeren können auch Brombeeren als Long Canes kultiviert werden. Die Brombeerruten werden ebenfalls im Vorjahr im Topf angezogen, um sie dann einzufrieren und im Folgejahr wieder aufzustellen.

Eine Einzelpflanze hat 5 bis 6 Ruten und sitzt in einem 4,7 Liter Topf, der bei der 1 jährigen Kultur schon die endgültige Topfgröße darstellt. Soll die Kultur über 2 oder 3 Jahre gezogen werden, empfehlen wird das Umtopfen in einen 10 Liter Topf. Die Töpfe werden in einem Abstand von 50 cm auseinander gestellt. So werden bei 2,5 Meter Reihenabstand 8.000 Pflanzen/ha benötigt.

Nach dem Ausstellen verzichtet man mittlerweile darauf, jede einzelne Rute an Drähten zu fixieren. Stattdessen werden die Ruten im Bündel mit dem Tonkinstab befestigt. Das einzelne Binden ist deutlich arbeitsaufwendiger. Dem Mehrertrag der Einzelfixierung von ca. 5% steht der Mehraufwand von 8000/ha höheren Bindekosten im Vergleich zur bündelweisen Befestigung. Das Bündeln verursacht zudem eine leichte Ernteverzögerung von 2 Tagen. Fruchtgröße und Klasse 1 Anteil unterscheiden sich dagegen nicht.

Mit ca. 45.000 Ruten pro Hektar stehen doppelt so viele Ruten auf der gleichen Fläche wie bei Himbeeren Long Canes. Hauptaugenmerk bei der Kultur liegt auf der Düngung und Wasserversorgung. Dadurch können sehr gute Fruchtgrößen erzielt werden, die dann einen Ertrag von 1 kg und mehr pro einzelner Rute zur Folge haben. Gesamterträge von 50 to/ha und mehr lassen sich erzielen. In guten Beständen lassen sich Pflückmengen von 9 bis 12 kg/Stunde realisieren.

Wir empfehlen jedoch für Neueinsteiger der Long Canes Kultur die Ansprache einer professionellen Beratung, um das Risiko zu senken, welches durch die hohen Produktionskosten verursacht wird.

### **Brombeeren Long Canes können geliefert werden:**

Loch Ness, Loch Tay, andere Sorten auf Anfrage



**Gebündelte Anbindung**



**Blüte**



**Ernte**





P.A.u.L. spricht

**Sprich mit PAuL -  
Düngung & Pflanzenschutz  
per Sprachnachricht  
erledigt!**

Zukunft Landwirtschaft

agroproject  
Technologie- und Informationssysteme  
GmbH & Co.KG  
Landersumerweg 10  
48431 Rheine  
Tel.: 05971 - 803 110 Mail: info@agroproject.de

Anzeige

# Johannisbeeren

Bei Johannisbeeren gibt es verschiedene Erziehungsformen – als Strauch, Hochstämmchen oder 1 – 3-triebig am Gerüst. Mit dieser sogenannten **Spindel- oder Heckenerziehung** lässt sich eine sehr gute Fruchtqualität und Pflückbarkeit erreichen:

An Pfählen von etwa 1,80 m Höhe in einem Abstand von etwa 5 – 6 m wird ein Draht in 1,50 m Höhe befestigt. Sträucher mit langen und kräftigen Trieben eignen sich am besten als Pflanzmaterial. Nach der Pflanzung wird lediglich je ein kräftiger Bodentrieb stehen gelassen und sofort ungekürzt an Bambusstäben angebunden.

Im April/Mai werden alle sich entwickelnden Boden- und Seitentriebe bis zur gewünschten Stammhöhe (30 – 40 cm) ausgebrochen. Um das Höhenwachstum optimal zu fördern, werden von Mai bis August alle weiteren Seitentriebe im unverholzten Zustand pinziert, d. h. lediglich die Triebspitze wird entfernt und ein 1 – 2 cm langer Zapfen verbleibt. Mitteltriebe müssen fortlaufend angebunden werden, damit sie nicht brechen.

Im 2. Standjahr entwickeln sich entlang der Hauptachse spindelförmig Seitentriebe. Je nach Sorte entfernt man im Februar/März des 3. Standjahres überschüssige Seitentriebe bis auf 6 – 10 Stück an der Hauptachse. Hier wachsen im 3. Standjahr Blüten und Früchte.

An einjährigen Seitentrieben entwickeln sich die Trauben mit der besten Fruchtqualität.

Im Winter nach der Ernte schneidet man die abgetragenen und überzähligen Seitentriebe auf kurze Zapfen zurück. Daraus entwickeln sich im kommenden Jahr neue Seitentriebe.

Bei Nachlassen der Seitentriebbildung nach einigen Jahren sollte ein neuer Bodentrieb nach oben gezogen werden.

Durch den lockeren Pflanzenaufbau können die Trauben nach Regenfällen gut abtrocknen.

Eine zwei- bis dreitriebige Erziehung (Dreisthecke) ist ebenso möglich, erreicht jedoch nicht so schnell die Endhöhe wie die eintriebige.

Beim Schnitt müssen die Sorteneigenschaften beachtet werden.



### **Standort und Sortenwahl**

Johannisbeeren gedeihen am besten in einem tiefgründigen, nährstoffreichen, mittelschweren und feuchten Boden bei einem pH-Wert von 5,5 bis 6,0. Standorte mit Staunässe, Bodenverdichtungen und häufigen Spätfrösten sind für Johannisbeeren ungeeignet.

Bei der Sortenwahl sollte man auf eine möglichst geringe Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingen achten.



# Johannisbeeren. Rote Sorten

Die Straucherziehung von Johannis- und Stachelbeeren war lange bewährter Standard. Für Frischware hat sich zunehmend die Spindel- oder Heckenerziehung durchgesetzt.



*Haronia-s-*

## **Jonkher van Tets**

Sie ist im frühen Erntebereich die wichtigste Sorte. Reift Mitte Juni. Im Anbau unproblematisch. Nachteilig ist die Neigung zum Verrieseln. Sehr aromatisch.

## **Haronia-s-**

Große, platzfeste Beeren, früh, nur kurz nach Jonkher, sehr langes Erntefenster, langstielig und gut pflückbar, sehr aromatisch, wenig Säure, sehr hohe Erträge möglich, Pflanzen für Herbst 2017 verfügbar! Sorteninhaber: Artevos, Freiburg

## **Telake**

Reift wenige Tage nach Jonkher van Tets, verrieselt ebenso, jedoch etwas produktiver als Jonkher van Tets, leuchtend rot.

## **Trent**

Reift 5 Tage nach Jonkher, sehr guter Geschmack. Schwachwüchsig und mittlerer Ertrag, trägt am kurzen Holz.

## **Detvan**

Reift eine Woche nach Jonkher. Aufrechter Wuchs, sehr gut für die Heckenerziehung geeignet, leichte Neigung zum Verrieseln.

## **Rolan**

Reift wie Detvan, hoher Ertrag, Neigung zum Verrieseln, sehr aromatisch.

## **Rotet**

Reift Mitte Juli, im Geschmack säurebetont.

## **Rovada**

Reift Ende Juli, Hauptsorte bei der späten Ernte, stark glänzend, lange Trauben, guter Geschmack. Sehr gut für CA-Lager geeignet.

## **Tatran**

Kurz nach Rovada reifend, hellrote Beeren, aufrechter Wuchs, sie neigt wenig zum Verrieseln.

## **Roodneus**

Reift wie Tatran, aufrechter Wuchs, sehr gut für den Anbau als Hecke geeignet. Sehr hoher Ertrag, etwas dunkle Beeren, geringe Neigung zum Verrieseln.

## **Red Poll**

Sehr späte Reife Anfang August, sehr große Beeren, tief dunkelrot, vergleichsweise kleine Früchte.

## **Augustus**

Die späteste Sorte im Anbau, eher schwachwüchsig und gerade noch für die Heckenerziehung geeignet, kleine Früchte, mittelrot.

## Johannisbeeren. Schwarze Sorten

Für schwarze Johannisbeeren lässt sich weiter eine wachsende Nachfrage verzeichnen.



### Wir empfehlen für die Handpflücke:

**Cheresneva** Robuste Sorte mit frühem Reifebeginn von Mitte Juni bis Mitte Juli. Große Beeren an mittellangen Rispen. Guter, milder Geschmack.

**Bona** Reifezeit Mitte/Ende Juni, sehr große und mild schmeckende Beeren, für Frischverzehr und Verarbeitung. Wenig anfällig für Mehltau.

**Black Pearl** Reifezeit Ende Juni/Anfang Juli, neue mittelspäte Sorte mit gutem Geschmack.

**Tenah** Reifezeit Anfang/Mitte Juli, hoher Ertrag. Große, lange Trauben, guter Geschmack, anfällig für Mehltau.

**Ometa** Mitte Juli, Spätsorte mit mittlerem Ertrag, aber gutem Geschmack.

### Für die maschinelle Ernte:

**Titania** Reifezeit Ende Juni, im Vergleich zu den neuen Sorten zu wenig Ertrag, mäßig aromatisch.

**Ben Alder®** Reifezeit Mitte Juli, etwas anfällig für Säulenrost und Blattfallkrankheit, Ertragseinbußen bei Trockenperioden.

**Ben Hope®** Reifezeit Mitte Juli, starker Wuchs, empfindlich gegen schwefelhaltige Mittel.

## Johannisbeeren. Weiße Sorten

Können eine Ergänzung des Sortiments darstellen.  
Wir empfehlen: Zitavia und Blanka



# Stachelbeeren. *Wachsende Nachfrage*

**Der Markt verlangt rote, leicht grüngestreifte Sorten.** Für Direktvermarkter können auch noch grüne Sorten, besonders im frühen Bereich, in Frage kommen. Die gegen den Stachelbeer-Mehltau robusten, älteren Sorten haben eine geringere Fruchtgröße und eignen sich daher eher für die Direktvermarktung.



<b>Invicta</b>	Früheste Sorte, grün, leicht behaart, guter Geschmack. Guter Absatz, solange noch keine roten Früchte auf dem Markt sind.
<b>Xenia</b>	Reifezeit ab 2. Juniwoche bis Ende Juni, Frucht hellrot, wenig behaart, guter Geschmack. Feste, mittelgroße Früchte (Durchschnitt 14 gr.). In der oberen Hälfte kaum Stacheln, geringe Anfälligkeit für Mehltau. Problematisch ist die Anfälligkeit für Sonnenbrand, wodurch ein Sonnenschutz notwendig ist.
<b>Laprima –S-</b>	Reifezeit früh mit „Xenia“. Marktreif grün/gelb mit leuchtendem Rot, vollreif dunkelrot. Mittel bis groß-früchtig, sehr attraktiv, nicht behaart, kaum platz anfällig. Aromatisch, bereits im marktreifen Zustand wohlschmeckend. Neigt zu hohem Behang, daher strikte Erziehung nötig.
<b>Leora –S-</b>	Reifezeit ca. 3-4 Tage nach Xenia. Marktreif grün/gelb mit leuchtendem Rot, vollreif dunkelrot. Große, unbehaarte Früchte mit gutem stachelbeertypischem Aroma für die Frischvermarktung. Regelmäßig hohe Erträge. Wüchsig-aufrechter Wuchs, geringe bis mittlere Anfälligkeit für Mehltau.
<b>Rote Triumph</b>	Reifezeit 10 Tage nach Xenia, allerdings mehltauanfälliger als Xenia und stark bedornt, die Früchte sind ebenfalls mittelgroß, aber stärker behaart.
<b>Pax</b>	Reifebeginn Ende Juni, stachellos, robust gegen Mehltau, aber auch sonnenbrandempfindlich.
<b>Achilles</b>	Reifebeginn Anfang Juli, die Hauptsorte, sehr ertragreich, wenig bedornt, mit großen, runden und aromatischen Früchten, aufrechter Wuchs, zur Spindelerziehung bestens geeignet.

Sorte	Reifezeiten (Region Ladenburg/Baden)	
	Juni	Juli
<b>Invicta</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Xenia</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Laprima –S-</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Leora –S-</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Rote Triumph</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Pax</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Achilles</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

# Heidelbeeren. *Beliebt, gesund*



## Duke

Ist eine frühe Sorte mit großen, festen Beeren. Die Reife beginnt bereits Ende Juni. Der Geschmack ist gut. Die Sorte ist sehr gut selbstbefruchtend und auch für den Tunnelanbau geeignet. Anfällig für Wurzelfäulen, dafür aber geringe Empfindlichkeit für Anthraknose und Botrytis.

## Bluecrop

In der Reife 2 Wochen nach Duke bis 25. August. Sehr guter Geschmack, sehr saftig, hoher Ertrag, hoher Kältebedarf.

## Elliott

Sehr spät, 4 Wochen nach Bluecrop bis 10. Oktober, schwach-süß mit wenig Säure, mittlerer Ertrag, gut lagerfähig.

**Weitere Sorten auf Anfrage.**

## Der Heidelbeermarkt wächst.

Diese Kultur bietet gerade Privatvermarktern Perspektiven. Aber auch für die Großmarkt-Belieferung ist im Frühbereich ein interessanter Markt vorhanden.

### Sorte

### Reifezeiten (Region Ladenburg/Baden)

	Juni	Juli	August	September	Oktober
<b>Duke</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Bluecrop</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Elliott</b>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

## Wir haben weitere Strauchbeeren in unser Sortiment aufgenommen:

- Maibeere (*Lonicera kamtschatica*)
- Cranberry (Var. *Macrocarpon*)
- Goji Beere (*Lycium Barbarum*)
- Preiselbeere (Var. *Vitis-Ideae*)



Für den **Transport** Ihrer Pflanzen können Sie gerne unseren Transportservice in Anspruch nehmen. Wir versenden unsere Pflanzen in Kühlfahrzeugen mit einer Fachspedition.

Bei vorrätiger Ware erfolgt die Auslieferung in der Regel innerhalb von 2 Werktagen.

Zudem bieten wir die **Selbstabholung** nach vorheriger Vereinbarung an.

Die Abholung ab Hof ist zu folgenden Zeiten möglich:

Montag – Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr und Samstags 8:00 bis 12:00 Uhr



Hege Pflanzen GmbH & Co. KG  
 D-68526 Ladenburg · Neuzeilsheim 19  
 Telefon 06203 930 80-70/-71 · Fax 930 80-97  
 info@hegeplanta.de

[www.hegeplanta.de](http://www.hegeplanta.de)